

Η επιστημονική τακτική που ακολουθείται από την οδοντιατρική είναι η διατήρηση των δοντιών του ασθενούς και η αποκατάστασή τους με θεραπευτικές ή προσθετικές μεθόδους, σε περίπτωση προβλήματος.

Όταν όμως διαπιστώνεται, ότι η κατάσταση του δοντιού μπορεί να δημιουργήσει διάφορες ζημιές και προβλήματα, τότε ο γιατρός οδηγείται στην αφαίρεση του.

Η χειρουργική εξαγωγή είναι η μέθοδος με την οποία αφαιρείται ένα δόντι.

Κυριότερες αιτίες που οδηγούν στην εξαγωγή δοντιού είναι:

Εκτεταμένη τερηδόνα.

Φρονιμίτες.

Περιοδοντίτιδα σε προχωρημένο στάδιο.

Οξεία ή χρόνια παθολογικά προβλήματα του πολφού, που άλλες θεραπείες δεν απέδωσαν.

Κάταγμα μετά από τραυματισμό.

Υπερέκφυση δοντιού.

Ορθοδοντική θεραπεία, που επιβάλλει την εξαγωγή ενός ή περισσότερων δοντιών.

Περιπτώσεις ημιέγκλειστων ή έγκλειστων δοντιών.

Υπεράριθμα δόντια που παρεμποδίζουν τα κανονικών δόντια.

Αισθητικοί λόγοι.

Δόντια που παρουσιάζουν ασυνήθιστη μορφολογία ριζών.

Η διαδικασία της εξαγωγής είναι πλέον μία εντελώς ακίνδυνη και γρήγορη διαδικασία, αρκεί ο γιατρός να είναι σωστά επιστημονικά καταρτισμένος.

Πριν την εξαγωγή του δοντιού, ο οδοντίατρος λαμβάνει την κλινική εικόνα του ασθενή και κάνει τις απαραίτητες ακτινογραφίες.

Οι ακτινογραφίες δείχνουν το μέγεθος, το σχήμα και την θέση του δοντιού καθώς και το περιβάλλον οστό.

Ο γιατρός χρησιμοποιεί ένα τοπικό αναισθητικό ή ηλεκτρονική αναισθησία(δες αναλυτικές πληροφορίες) για να μουδιάσει την περιοχή του στόματος στην οποία θα πραγματοποιηθεί η εξαγωγή.

**Μετά την εξαγωγή συνίσταται οι παρακάτω οδηγίες:**

Το πρώτο 24ωρο μετά την επέμβαση αποφύγετε σκληρές ή ζεστές τροφές.

Αποφύγετε να δαγκώνετε από την πλευρά του στόματος που έγινε η εξαγωγή.

Μετά από 12 ώρες μπορείτε να βουρτσίσετε τα δόντια σας, αλλά με προσοχή.

Στην περίπτωση που εμφανιστεί πόνος μετά την αποδρομή της αναισθησίας, πάρτε ένα παυσίπονο.

Μην παίρνετε αντιβιοτικά μετά την εξαγωγή, εάν δεν σας το έχει υποδείξει ο γιατρός σας. Για να αποφύγετε το οίδημα (πρήξιμο), τοποθετείστε ψυχρά επιθέματα εξωτερικά. Αποφύγετε το κάπνισμα για 72 ώρες μετά την επέμβαση.